

TETANUS (*TETANUS TRAUMATICUS*)

Toto život ohrožující onemocnění nebylo u nás vzácné. Po zavedení očkování kombinovanou trivakcínou se záškrtcem a černým kašlem, následované pentavakcínou až po dnešní nejmodernější hexavakcínou vymizel dětský tetanus a po vakcinaci dospělých jsou hlášeny 1-4 případy ročně. K nim pak dochází vesměs u osob, které buď nebyly vůbec očkovány, nebo očkování (*vakcinace*) nebyla provedena správně.

Původcem nákazy je sporulující tyčka *clostridium tetani*, která se běžně nachází ve stolici skotu, koní i člověka. Spóry se s hnojením dostávají do půdy. I při drobném zranění, při němž se do rány dostane cizí těleso (*tříska, hlína*) kontaminované spórami klostridií, dojde k onemocnění.

Za několik dní až týdnů po úrazu dojde ke křeči žvýkacích svalů (*trismus*), poté ke stahu obličejového svalstva následované napětím svalů šíje, zad i břicha. Na různé podněty dochází ke generalizovaným křečím, eventuálně i k laringospazmu (*stažení hrtanu*). Při křečích stoupá teplota, je výrazné pocení a dochází k zástavě dechu a smrti pacienta.

Proto je nařízeno povinné očkování proti tetanu v našem případě očkovací látkou TETAVAX.

Jedinou perfektní ochranou proti tomuto smrtelnému onemocnění je pravidelné očkování a přeočkování TETAVAXEM.

Základní očkovací kalendář:

- 1. Dávka.
- 2. Dávka za 6 týdnů.
- 3. Dávka za 6 měsíců.
- 4. Přeočkování po 10-ti letech.

Proto prosím všechny registrované pacienty, aby si zkontrolovali očkování, eventuálně volali naší zdravotní sestru v ordináčnících hodinách na telefon ordinace Teplice nad Metují: **491 581 190, ordinace Broumov: **491 521 751** a ordinace Police nad Metují: **491 814 875**, která jim sdělí, jestli je nutné očkovat a kdy je nutné přeočkování.**

Salve, Dr. Langer